



Factsheet


ZWARTE ROODSTAART

Eieren leggen	Broeden	Jongen vliegvlug na
4-6 dagen	12-14 dagen	15-17 dagen
<i>In totaal 31-37 dagen van eileg tot vliegvlug jong</i>		

KALENDER

De zwarte roodstaart leeft het grootste deel van het jaar solitair of in paren en zingt vanaf een hoge zangpost.

Maart tot eind april
 Voorjaars trek en aankomst



Michiel Geven

- Aankomst in het land.
- Is voor nestplaatsen afhankelijk van spleten en gaten in gebouwen, en is hierin weinig kieskeurig. Broedt ook in steenhopen of stapels bouw materiaal.
- Het is cruciaal dat er in de omgeving van het nest open, droge, niet ingerichte terreinen aanwezig zijn. De leeftijd van de gebouwen speelt minder een rol.
- Solitaire broeder met een strikt eigen broedterritorium. In geschikt gebied zijn aansluitende territoria.

Half april - half juli
 Broedseizoen



Marius Varesvuo

- 2 weken na aankomst begint nestbouw, duurt ongeveer 1 week.
- Eileg half april tot in juni, met piek eerste helft mei.
- 2 (soms 3) legsels per jaar, met 4-7 eieren.
- Voedsel bestaat uit insecten, insectenlarven en kleine ongewervelde dieren die in de vlucht of op de grond gevangen worden.
- Vliegvlugge jongen worden nog 10 dagen gevoerd door de ouders.

VERVOLG KALENDER

Half juli - oktober
Najaarstrek

November - februari
Overwintering



- Jongen verlaten broedgebieden eerder dan de adulte vogels en zwerven rond.
- In deze periode eet de soort naast insecten ook zaden, bessen en ander fruit.
- Na een aantal weken start de trek naar wintergebieden.

- Overwintert in Zuidwest-Europa en in Afrika ten noorden van de Sahara.
- In toenemende mate overwintert de zwarte roodstaart in Nederland.

Inrichting

Beheer



- Er zijn speciale neststenen en kasten voor de zwarte roodstaart in de handel.
- Een neststeen kan ingemetseld worden bij verbouwingen of nieuwbouw, zowel in de stad als op een industrieterrein of spoorwegemplacement.
- Plaats de neststeen of kast boven de 2 meter.
- Zorg dat de vliegopening op het noorden of oosten hangt.

- In de nabijheid van het nest heeft de zwarte roodstaart zonnig, droog en open terrein met korte vegetatie nodig. Hij mijdt natte gebieden en gebieden met dichte en hoge gewassen.

- Behoud kleine stukjes braakland of leg ze aan. Volledig ingerichte gebieden verliezen hun aantrekkelijkheid voor de zwarte roodstaart.

- Bruine daken bieden in het broedseizoen een compleet habitat voor de zwarte roodstaart. Een bruin dak bestaat uit een substraat van vermalen steen van 25 mm tot gruis en wordt in dieptes variërend van 5 tot 15 cm op het dak aangebracht. Tussen de steenslag worden enkele grotere stenen en stukken hout geplaatst. De planten laat men spontaan opkomen.

- Om open gebieden geschikt te houden moeten ze kaal gehouden worden.
- Gebruik geen (kunstmatige) meststoffen.

- Maai het dak eenmaal per jaar vroeg in het jaar (eind februari/begin maart) met een motorzeis of ruwgrasmaaier om opslag van houtige gewassen te voorkomen.
- Gebruik geen (kunstmatige) meststoffen.
- Het gebruik van insecticiden heeft een negatief effect op de voedselsituatie van alle insectenetende vogels, waaronder de zwarte roodstaart.



Zie ook
maatregelfactsheet:

- Bedrijventerreinen
- Nieuwbouw
- Renovatie
- Na-isolatie

Deze factsheet is mede tot stand gekomen met financiële steun van:



JAAP VAN DUIJN
VOGELFONDS



Dinamo Fonds
DIEREN - NATUUR - MONUMENTEN

Barbara Eveline Keuning Stichting

Provincie Noord-Brabant

Wettelijke bescherming

De zwarte roodstaart is een beschermde soort. Nesten van zwarte roodstaarten zijn bij zwaarwegende omstandigheden jaarrond beschermd en mogen zonder ecologische toets niet weggenomen of vernietigd worden. Een ontheffing van Gedeputeerde Staten van de betreffende provincie is nodig als blijkt dat er onvoldoende alternatieve nestplekken in de omgeving aanwezig zijn. Voor meer informatie, kijk op www.vogelsendewet.nl