



Factsheet

SPREEUW

Eieren leggen	Broeden	Jongen vliegvlug na
4-6 dagen	11-13 dagen	19-24 dagen
<i>In totaal 34-43 dagen van eileg tot vliegend jong</i>		

KALENDER


De spreeuw is een sociale vogel die in Nederland jaarrond in groepen leeft.

Maart
Voorjaars trek en aanvang van broedseizoen



Marc Guyt

- In Nederland overwinterende spreeuwen trekken weg.
- Om te broeden keren zij terug naar vaste broedplaatsen.
- Start nestbouw, duurt enkele dagen tot een week.
- Semi-koloniaal broedend in holtes in bomen en gebouwen, ook in nestkasten.
- Broedhabitat: vooral dorpen, steden en bos.
- Nestelen in holtes, gebouwen en nestkasten in de directe omgeving van foerageergebied/voedsel.



Snouterstock

Half april - juli
Broedseizoen



Philipp Friskorn

- Meestal één legsel met 4 tot 6 eieren.
- Soms vervolglegel.
- Voedsel volwassen vogels is veelzijdig: bodemfauna, vruchten, zaden en granen en menselijke voedselresten.
- Voedsel nestjongen: bodemfauna (vooral emelten) en insecten.
- Worden nog 4-5 dagen gevoed door ouders na uitvliegen.

VERVOLG KALENDER

Juni - november Najaarstrek



Jolke Altenburg

- Een deel van de broedvogels trekt in de winter weg, maar blijft relatief dicht bij huis: België, Noordwest-Frankrijk en Zuid-Engeland. Uit noordelijke en oostelijke streken van Europa trekken grote aantallen spreeuwen door Nederland, waarvan een groot deel in ons land overwintert.
- Buiten het broedseizoen wordt het dieet veelal aangevuld met bessen.
- Habitat buiten broedseizoen: zowel stedelijke omgeving als agrarisch- en natuurgebied; buiten broedseizoen in (grote) groepen, en (vaak zeer) grote gezamenlijke slaapplekken.
- Najaarstrek van juni (jonge vogels) tot in november.

November - februari Overwintering




Arnold Meijer

- Buiten broedseizoen nauwelijks binding met het nest, maar vanaf januari worden potentiële nestplaatsen bezocht en wordt er soms in geslapen.

Inrichting

Beheer



Spuitstock

- Er zijn diverse speciale nestkasten voor spreeuwen in de handel.
- Plaats bij voorkeur meerdere kasten bij elkaar aan gebouwen of bomen.
- Ophanghoogte 2-5 meter, aan gebouwen of bomen.

- Niet verwijderen van nestplaatsen. Spleten en gaten in gebouwen niet dichtmaken.
- Bij onderhoud aan bomen met nestholtes dient men voor vervangende nestgelegenheden te zorgen.
- In het najaar moet de nestkast schoongemaakt worden.

- Kort grasland met een rijk bodemleven - zo dicht mogelijk bij het nest - is belangrijk. In de regel binnen 500 meter.
- Zorg voor besdragende struiken.

- Gebruik geen gif. Emelten en andere bodemfauna in gazons en grasland kunnen met biologische bestrijding worden tegengegaan.
- Snoei buiten het broedseizoen in de winter en niet alles in hetzelfde jaar (maar om en om).



Zie ook maatregelfactsheet:

- Sportvelden
- Bermen en groenstroken
- Nieuwbouw
- Renovatie
- Na-isolatie

Deze factsheet is mede tot stand gekomen met financiële steun van:



JAAP VAN DUIJN
VOGELFONDS



Dinamo Fonds
DIEREN - NATUUR - MONUMENTEN

Barbara Eveline Keuning Stichting

Provincie Noord-Brabant

Wettelijke bescherming

De spreeuw is een beschermde soort. Nesten van spreeuwen zijn bij zwaarwegende omstandigheden jaarrond beschermd en mogen zonder ecologische toets niet weggenomen of vernietigd worden. Een ontheffing van Gedeputeerde Staten van de betreffende provincie is nodig als blijkt dat er onvoldoende alternatieve nestplekken in de omgeving aanwezig zijn. De spreeuw is door een aantal provincies onder de Wet natuurbescherming aangewezen als soort die belangrijke schade veroorzaakt. In de relevante provinciale verordeningen is vastgelegd welke maatregelen onder voorwaarden door grondgebruikers mogen worden gebruikt ter voorkoming of bestrijding van belangrijke schade door deze soort. Voor meer informatie, kijk op www.vogelendewet.nl